

Offlabelprodukter

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Giltighetstid
Centium 36 SC	Frilandsgurka	Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av frilandsgurka. 1 behandling med 0,25 l/ha.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2008-04-16 t.o.m. 2012-10-31 (Gäller så länge Centium 36 SC, reg nr 4778 är godkänt)
Centium 36 SC	Crysanthemum	Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av Chrysanthemum. Dos: 0,25 l/ha vid ett tillfälle. Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år	Skånes Trädgårdsfröodlarsförening c/o Hurshållningssällskapet Malmöhus	Fr.o.m. 2008-04-08 t.o.m. 2012-10-31 (Gäller så länge Centium 36 SC, reg nr 4778 är godkänt)
Centium 36 SC	Spenatfrö	Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av spenatfrö. Dos: 0,25 l/ha. Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år.	Skånes Trädgårdsfröodlarsförening	Fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2012-10-31 (Gäller så länge Centium 36 CS, reg nr 4778 är godkänt.)
Epok 600 EC	Penséodling, rosodling	Preparatet får användas mot bladsvamp, penséodling och rosodling. Dos penséodling: 50–100 ml till 100 l vatten. 150–200 ml utspädd lösning per m ² . Dos rosodling: 100 ml till 100 l vatten. Högst tre behandlingar. Skyddshandskar skall användas under och efter behandling vid arbete med plantorna.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2002-12-16 t.o.m. 2012-12-31 (Gäller så länge Epok 600 EC, reg nr 4361 är godkänt.)
Epok 600 EC	Prydnadsväxter i växthus	Preparatet får användas för bekämpning av bladmögel i odlingar av prydnadsväxter i växthus. Dos: 50–100 ml till 100 l vatten. 150–200 ml utspädd lösning per m ² . Högst 3 behandlingar. Skyddshandskar ska användas under och efter behandling vid arbete med plantorna.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2009-06-24 t.o.m. 2012-12-31 (Gäller så länge Epok 600 EC, reg nr 4361 är godkänt)
Fenix	Lupiner	Preparatet får användas mot örtogräs i odling av lupin. Dos: högst 1,5 l/ha och säsong. Högst: 1 behandling per år före uppkomst.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2010-04-22 t.o.m. 2014-01-31 (Gäller så länge Fenix, reg nr 4123 är godkänt.)
Fenix	Palsternackor	Preparatet får användas mot ogräs efter uppkomst i odlingar av palsternackor. Dos: Högst 1,5 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar om 0,5 l/ha eller 2 behandlingar om 0,75 l/ha.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2007-03-30 t.o.m. 2014-01-31 (Gäller så länge Fenix, reg nr 4123 är godkänt.)
Fenix	Åkerbönor	Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i odlingar av åkerbönor. Dos: högst 2,5 l/ha. Behandling ska ske före uppkomst	Lovang lantbrukskonsult AB	Fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m. 2014-01-31 (Gäller så länge Fenix, reg nr 4123 är godkänt.)
Fenix	Frösådd lök	Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av frösådd lök. Dos: max 0,7 l Fenix/ha. Högst 2 behandlingar. Behandling får ej ske senare än i 4-bladsstadiet	Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter ek. för.	Fr.o.m. 2004-05-28 t.o.m. 2014-01-31 (Gäller så länge Fenix, reg nr 4123 är godkänt.)
Fenix	Prydnadsväxter	Preparatet får användas mot ogräs vid drivning av prydnadslökväxter i växthus. Dos: 0,1 l Fenix per 10 l vatten.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2014-01-31 (Gäller så länge Fenix, reg nr 4123 är godkänt.)
Fenix	Dill, Persilja, Morötter, Rotselleri och Gröna ärter	Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av dill och persilja samt efter uppkomst i gröna ärter, morötter och rotselleri. Gröna ärter Dos: Högst 0,80 l/ha efter uppkomst; 1 behandling/år. Sista behandlingstidpunkt: när ärtorna har 4 internoder (BBCH 34). Morötter Dos: Högst 1,25 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 0,75 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar/år. Sista behandlingstidpunkt: när morötterna har 4 örtblad (BBCH 14). Rotselleri Dos: Högst 0,83 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar/år. Karenstid: 70 dagar. Dill Dos: Högst 2 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 1 l/ha efter uppkomst; 1 behandling/år. Sista behandlingstidpunkt: när dillen har 2 örtblad (BBCH 12). Persilja Dos: Högst 2 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 0,75 l/ha efter uppkomst; 2 behandlingar/år. Sista behandlingstidpunkt: när persiljan har 4 örtblad (BBCH 14).	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2010-04-09 t.o.m. 2014-01-31 (Gäller så länge Fenix, reg nr 4123 är godkänt)

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Giltighetstid
Frupica SC	Skogsplant-skolor	Preparatet får användas mot svampangrepp i skogsplant-skolor. Dos: 0,8 l produkt/ha. Högst två behandlingar. För att skydda akvatiska organismer krävs att anvisningarna i "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd" följs liksom att bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1997:2 iakttas.	SCA Skog AB, NorrPlant	Fr.o.m. 2009-02-02 t.o.m. 2014-09-30 (Gäller så länge Frupica SC, reg nr 4781 är godkänt.)
Fungazil 100	Gurka i växthus	Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus. Dos: 0,075 %-ig lösning. Högst 2 behandlingar. Karenstid: 3 dagar.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2006-03-31 t.o.m. 2011-12-31 (Gäller så länge Fungazil 100, reg nr 4699 är godkänt.)
Mospilan SG	Gurka i växthus	Preparatet får användas mot skadeinsekter i odlingar av gurka i växthus. Dos: 0,25–0,50 kg Mospilan SG/ha. Högst 3 behandlingar/år. Karenstid: 3 dagar.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2008-07-21 t.o.m. 2014-12-31 (Gäller så länge Mospilan SG, reg nr 4739 är godkänt.)
Nissorun	Plantskolor och prydnadsväxter	Preparatet får användas för bekämpning av spinnkvalster i plantskolor och odlingar av prydnadsväxter. Dos Prydnadsväxter: 0,05 %-ig lösning och högst 2 behandlingar per säsong. Dos Plantskola: 1 kg Nissorun/ha och högst 2 behandlingar per säsong.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2004-01-21 t.o.m. 2010-12-31 (Gäller så länge Nissorun, reg nr 3826 är godkänt.)
Nissorun	Frilandsgurka	Preparatet får användas för bekämpning av spinnkvalster i odlingar av frilandsgurka. Dos: 0,3 Nissorun/ha. Högst 2 behandlingar per år. Karenstid: 3 dagar.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2010-08-12 t.o.m. 2010-12-31 (Gäller så länge Nissorun reg nr: 3826 är godkänt.)
Ranman	Frilandsgurka	Preparatet får användas mot bekämpning av svampangrepp i odlingar av frilandsgurka. Dos: 0,2 l Ranman/ha. Högst 6 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 3 dagar.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2009-06-25 t.o.m. 2012-12-31 (Gäller så länge Ranman, reg nr 4586 är godkänt.)
Warrant	Sallat och sallat-skål i växthus	Preparatet får användas mot bladlöss vid plantuppdragning i växthus av sallat och sallat-skål.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	Fr.o.m. 2007-05-31 t.o.m. 2014-01-31 (Gäller så länge Warrant 700 WG är godkänt.)