

Topsin WG

Topsin är ett svampmedel i höstsäd och prydnadsväxter.

Bredverkande, systemiskt svampmedel

Både förebyggande och kurativ effekt

Allmän information

Användningsområde

Mot svampsjukdomar i odlingar av höstvet, råg, höstkorn och prydnadsväxter. Mot markburna svampsjukdomar i samband med sådd och plantering av prydnadsväxter genom jordbehandling. Behandling av höstsäd får ske senast vid upphörande blomning (BBCH 69) All annan användning är otillåten.

Registreringsnr.	4888
Verksam beståndsdel	Tiofanatmetyl 700 g/kg
Behörighetsklass	1 L
Förpackning	1 kg
Lagring	Torrt och svalt
Tillverkare	Nippon Soda Co., Ltd.

Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efterhand som tillväxt sker.

Användning

Fyll halva tanken med vatten. Håll sedan Topsin i tanken under omrörning. Fyll med vatten.

Vattenmängd 100–400 l/ha.

Flertalet bekämpningsmedel kan blandas i den färdiga produkten. Sprutvätskan används omedelbart efter beredning.

Höstbehandling mot utvintringssvampar

Topsin ger ett gott skydd mot snömögel och stråknäckare. Bäst effekt uppnås om man sprutar från mitten av oktober fram till permanent snötäcke. Ju senare desto bättre när det gäller snömögel. Tillfällig nattfrost kan utnyttjas för att uppnå bärighet i fält.

OBS Bör ej sprutas när växterna är belagda med mycket rimgrost. Kan kombineras med ogräsbekämpningen.

Dos 0,3 kg/ha (0,4 kg vid kraftiga, tidigt sådda bestånd).

Vårbehandling mot stråknäckare

Spruta omedelbart före stråskjutning, när grödan är 25–30 cm hög. Denna behandling ger effekt på stråknäckarsvampen samt en viss nedhållande effekt mot Septoria.

Dos 0,4–0,5 kg/ha.



Mot fusarium i höstvet och råg fram till upphörande blomning (BBCH 69)

Behandlingen skall ske från begynnande blomning till upphörande blomning.

Dos 1,1 kg/ha

OBS Medel som innehåller tiofanatmetyl får användas endast 1 gång per gröda i stråsäd.

Prydnadsväxter

Sprutning mot diverse svampsjukdomar

Dos 0,075 % (75 g/100 l vatten).

Sprutvattning mot jordburna svampar

Dos Vålrotade äldre plantor, 15 g/10 m² i 20–30 l vatten. Till frösådder och sticklingar, 3 g/10 m² i 20–30 l vatten.

Varningstext

Riskupplysningar: Farligt vid inandning och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt. Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Särskilda miljörisiker: Giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag. Giftigt för daggmask och andra marklevande organismer.

Skyddsanvisningar: Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med huden. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar. Vid sprutning: Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2).

Vid sprutning och hantering av behandlade plantor (i produktionsledet): Använd skyddshandskar och heltäckande skyddskläder. Tillred brukslösning ska användas utan dröjsmål.

Läs medföljande säkerhetsdatablad.