

Danitron® 5 SC

Mot kvalster i odlingar av jordgubbar och prydnadsväxter.

Behandling i jordgubbar får ej ske senare än 7 dagar före skörd.

All annan användning är otillåten.



Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga rörliga stadier av spinnkvalster

God långtidseffekt i fält

Allmän information

Registreringsnr.	4604
Verksam beståndsdel	Fenpyroximat 53 g/l
Behörighetsklass	2 L
Förpackning	10 x 1 liter
Lagring	Torr och svalt. Undvik frost och direkt solljus
Tillverkare	Nihon Nohyaku Co

Danitron är ett kvalstermedel med mycket god effekt mot spinnkvalster och god effekt mot jordgubbskvalster. Danitron har en snabb kontaktverkande effekt på kvalsternas rörliga stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhindrar dessutom hudömsningen i outvecklade stadier. Detta gör att Danitron normalt har en mycket god långtidseffekt i fält (mer än 30 dagar). Danitron har god persistens mot både solljus och regn. Den direkt kontaktverkande effekten är snabbare vid högre temperaturer.

Resistens

Danitron är en akaricid med en kemisk struktur som skiljer sig från andra kvalstermedel. Det föreligger därför ingen risk för korsresistens mellan Danitron och andra medel. Men för att motverka en uppbyggnad av motståndskraftiga kvalsterstammar rekommenderas ändå enbart en användning av Danitron per odlings säsong och/eller gröda. Om behov finns för fler behandlingar ska andra kvalstermedel användas.

Predatorer

Danitron har ringa effekt på predatorer och nyttoinsekter. Vuxna individer av *Amblyseius longispinus* påverkas ej medan vuxna individer av *Phytoseilus persimilis* påverkas till viss grad vid doserna 25 respektive 50 ppm.

Planttolerans

Danitron har testats på ett stort antal arter och kulturer utan plantskador. Eftersom tillverkaren dock inte kan lämna garantier för alla nya kulturer och sorter som ständigt tas fram är det viktigt att alltid göra en mindre provbehandling innan större partier behandlas. Behandling på nejlikor, rosor och begonior efter blominitiering kan orsaka en del missfärgning av blombladen.

Användning

Prydnadsväxter och plantskolor

Mot spinnkvalster. Behandla så snart angrepp upptäcks.

Dos 0,1–0,15%.

Jordgubbar

Mot spinnkvalster. Behandla före eller efter skörd vid synligt angrepp. Tillsätt vätmedel för bästa effekt. **Dos** 1,5 l/ha.

Mot jordgubbskvalster. Behandla efter skörd och ev blasthuggning. För tillräcklig effekt mot jordgubbskvalster måste vätmedel, Silwet Gold, tillsättas.

Dos 1,5 l/ha. Silwet Gold 25 ml/1000 l sprutvätska.

Vattenmängd

Eftersom Danitron enbart är kontaktverkande är det mycket viktigt att spruta så att fullgod täckning av sprutvätskan erhålls. Använd därför stora vattenmängder vid behandling, minst 500 l/ha.

Varningstext

Farligt vid inandning. Irriterar ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med ögon och hud. Varken ät, drick eller rök under hanteringen.

Vid stänk i ögon Skölj genast med rikligt med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.

Vid hudkontakt Tvätta genast med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder.

Vid förtäring Undvik att framkalla kräkning, kontakta läkare och visa etikett eller säkerhetsdatablad.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid risk för inandning av sprutdimma Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2).

Särskilda miljörisiker Mycket giftig för vattenlevande organismer. Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag. Kan orsaka långsiktig skada på vattenmiljön.