

Fazor®

Fazor är ett groningshämmande medel som får användas i kepalök.

Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras

Allmän information

Användningsområde

För groningshämmande behandling av kepalök. Behandling får ej ske senare än 14 dagar före uppkörning eller lossning av löken.

Fazor får inte användas på lök som ska säljas till konsumenter före februari året efter behandlingen. All annan användning är otillåten.

Registreringsnr.	4683
Verksam beståndsdel	Maleinhydrazid (kaliumsalt) 81 vikt-% (varav ren maleinhydrazid 60 vikt-%)
Behörighetsklass	2 L
Förpackning	2½ kg
Lagring	Torr och svalt
Tillverkare	Chemtura

Det är viktigt att välja rätt spruttidpunkt i förhållande till lökens utveckling för att få optimal effekt. Löken skall behandlas när ca 10 % har börjat vika sig eller lägga sig (ej över 30–40 %), lämpligen i mitten av augusti månad eller ungefär 14 dagar före uppkörningen eller lossningen. Bladen skall fortfarande vara gröna. Beakta karenstiden.

Användning

Dos 3,0–3,5 kg/ha.

Vattenmängd ca 400–500 l/ha.

Fyll sprutan med 2/3 av vattenbehovet, tillsätt preparatet och resterande vattenmängd under fortsatt omrörning. Låt omrörningen fortsätta hela spruttiden. Blanda inte Fazor med andra preparat.

Spruta med finfördelande munstycke. Undvik dubbelsprutning. Regn inom 24 timmar kan reducera effekten.

Varningstext

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Undvik kontakt med hud. Andas inte in preparatet. Använd lämpliga skyddskläder inkl gummistövlar, skyddshandskar samt ögonskydd.

Vid stänk i ögonen spola genast med mjuk vattenstråle i några minuter.

Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten. Särskilda miljörisiker: Förorena ej ytvatten och vattendrag. Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag.

